

IJzerbelastingstest

De ijzerbelastingstest kan aanwijzingen geven over de mate waarin ijzer in het lichaam wordt opgenomen. Een tekort aan opname van ijzer kan een anemie (bloedarmoede) veroorzaken. De test bestaat uit het toedienen van ijzer (ijzertablet) en het meten van de ijzerhoeveelheid in het bloed voor en na inname.

U moet zich voor het onderzoek aan de volgende voorschriften houden:

De dag voor het onderzoek:

Vanaf 22.00 uur mag u niets meer eten, drinken (behalve water, thee zonder suiker en melk) of roken.

De dag van het onderzoek:

's Ochtends mag u nog steeds niet eten, drinken (behalve water, thee zonder suiker en melk) en roken.

Bij het afnamelaboratorium

U komt op de afgesproken tijd met uw ponsplaatje en het formulier naar het afnamelaboratorium in de polikliniek (begane grond).

Meteen bij binnenkomst in de wachtkamer van het afnamelaboratorium staat een pilaar met een labelprinter. Kies op de labelprinter voor 'Overige diensten'. Het linkerdisplay aan de muur in de wachtruimte laat u weten wanneer het uw beurt is om naar de balie te gaan.

Hoe gaat het onderzoek

Eerst wordt u geprikt voor bloedafname, waarna u vier pillen ferrofumaraat (ijzer) krijgt. Daarna moet u twee uren wachten (u mag nog steeds niet eten of drinken) waarna opnieuw bloed wordt afgenomen (u kunt, als u in de buurt woont, tussentijds naar huis). Hierna is de test afgelopen en mag u weer naar huis.

Vragen?

Voor uw afspraak kunt u zich melden op het Afnamelaboratorium.

Als u nog vragen heeft of verhinderd bent, kunt u zich wenden tot: Klinisch Chemisch Laboratorium: tel (0512) 588 812 (afnamelaboratorium).