

Nazorg pijnbehandeling

Informatie	2
Contact	3

Vandaag heeft u een behandeling van de pijnarts gehad.

Informatie

- De pleister(s) kunt u bij thuiskomst of 's avonds verwijderen
- Na de behandeling kan napijn optreden: deze napijn kan hevig zijn en dagen tot 2 weken aanhouden, maar verdwijnt vrijwel altijd, tegen de pijn kunt u eventueel een pijnstiller innemen
- De pijnmedicatie die u al heeft mag u doorgebruiken, zoals u voor de behandeling deed, indien u duidelijk pijnminderung ervaart, kunt u gaan afbouwen met de pijnmedicatie
- Pas na zes weken tot twee maanden is het zinvol om het resultaat van de behandeling te beoordelen, waarbij halvering van de pijn als positief wordt gezien
- Het is echter goed mogelijk dat u al eerder een gunstig effect op de pijnklachten bemerkt (soms aansluitend direct na de behandeling al, soms na enkele weken)
- Na de behandeling krijgt u een controle-afspraken mee, als de arts dat met u besproken heeft
- Aan de hand van de resultaten bekijkt de specialist of de behandeling herhaald moet worden.
- Herstarten van antistollingsmiddelen (= bloedverdunners, zoals Sintrom, Marcoumar) waarvoor controle bij de trombosedienst noodzakelijk is, gaat in overleg met de trombosedienst

- Andere bloedverduunners mogen 24 uur na de behandeling herstart worden
- Bijwerkingen corticosteroïden:
 - Oplopen van de suikerspiegel (tijdelijk)
 - Oplopen van de bloeddruk (tijdelijk rood gelaat)
 - Hoofdpijn
 - Menstruatiestoornissen
 - Verminderde betrouwbaarheid van anticonceptie
 - Opvliegers

Contact

Bij complicaties na een behandeling, kunt u telefonisch contact opnemen:

3

- 0512-588 381: tussen 08.30 en 12.00 uur met het Pijncentrum
- 0512-588 888: tussen 12.00 en 16.30 uur met de receptie
- (0900) 1127112: buiten kantoor tijden kunt u contact opnemen met Dokterswacht Friesland.