

Lidocaïne-infuus therapie

Lidocaïne-infuus

Wanneer u komt voor de behandeling met lidocaïne intraveneus, krijgt u een infuus in een bloedvat, waardoor de lidocaïne wordt toegediend in de bloedbaan. Tijdens de behandeling ligt u aan de monitoring om veranderingen in uw ademhaling, bloeddruk en hartritme zo snel mogelijk op te merken. Tevens zal worden bijgehouden of er effecten zijn van lidocaïne op uw bewustzijn.

Eerst zal een injectie lidocaïne worden toegediend, die gevolgd wordt door continue toediening van lidocaïne middels een perfusor-pomp gedurende maximaal 5 uur.

Wij raden u aan op de dag van de behandeling:

- Goed te ontbijten
- Makkelijke kleding te dragen
- Geen contant geld of waardevolle spullen mee te nemen
- Iets ter ontspanning mee te nemen: een boek, tijdschrift of uw tablet
- U mag na de behandeling niet zelf auto rijden, zorgt u voor vervoer?

Bijwerkingen

De behandeling met intraveneus lidocaïne kan een aantal bijwerkingen hebben.

Regelmatig voorkomende bijwerkingen

- Draaierigheid
- Slaperigheid
- Doof gevoel rondom de mond

Soms voorkomende bijwerkingen

- Metaalsmaak in de mond
- Hartritme stoornissen, zoals een onregelmatige, versnelde of vertraagde hartslag
- Overgevoelighedsreacties, zoals kortademigheid en jeuk

U dient uw dokter te waarschuwen:

Indien een van het onderstaande voor u van toepassing is, dient u dit **voorafgaande** aan de behandeling te melden:

- U bent (mogelijk) zwanger
- U geeft borstvoeding
- U bent overgevoeligheid voor lidocaïne of andere verdovingsmiddelen
- U heeft ernstige lever- of nierfunctiestoornissen

Na de behandeling

Een aantal weken na de behandeling wordt u gebeld om te horen of de behandeling effect heeft gehad. Het resultaat van deze behandeling verschilt per persoon.