

Methylprednisolon INJECTIE

U heeft een injectie gekregen met het medicijn Methylprednisolon (gecombineerd met Ropivacaine). Methylprednisolon betreft een bijnierschors hormoon en hierdoor kunnen bijwerkingen optreden:

- Roodheid van de huid in het gezicht of een koortsig gevoel. Dit is onschuldig, het duidt niet op een allergische reactie en trekt vanzelf weg
- Tijdelijke toename van de zweetproductie
- Hoofdpijn, kortdurende duizeligheid
- Pijn op de injectieplaats. Aan de injectie wordt altijd een plaatselijk verdovend middel toegevoegd om de pijn te verminderen. Ondanks dit kan de pijn nog enkele dagen aanhouden. U kunt hiervoor bijvoorbeeld paracetamol gebruiken
- Menstruatieverstoring: eenmalige verandering van de eerstvolgende menstruatie (vroeger, langer, meer bloedverlies dan normaal). Deze bijwerkingen kunnen ook optreden bij vrouwen in de menopauze
- Bij suikerziekte (diabetes mellitus) kan de bloedglucose ontregelen

De bovenstaande klachten kunnen een paar dagen aanhouden. U hoeft *alleen* contact op te nemen met de poli Orthopedie *indien*:

De huid ter plaatse van de injectieplaats rood wordt
U (gemeten) koorts heeft
Het geïnjecteerde gewricht pijnlijker wordt
U jeuk krijgt over het gehele lichaam
Duizeligheid en/of benauwdheidsklachten optreden

De volledige bijsluiter kunt u opvragen bij de polikliniek Orthopedie.

Bij verdere vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met de polikliniek Orthopedie:

Aanwezig: maandag t/m vrijdag

Tijd: 08.30 - 16.30 uur

Telefoon: 0512 - 588 805

Indien de polikliniek gesloten is, kunt u bellen met de Spoedeisende hulp: tel. 0512 - 588 146